

桃園市青埔國小紅火蟻防治宣導單



如何避免被紅火蟻叮咬？

Keeping away from RIFA

入侵紅火蟻會築出隆起地面高於 10 公分以上的蟻丘，成熟蟻巢明顯隆起的蟻丘則是極容易快速認定紅火蟻的方法，由於紅火蟻會保護巢穴，一旦踏到紅火蟻的蟻巢，火蟻會傾巢而出攻擊敵人，在野外發現蟻巢時，不要去干擾它，並注意避免踩到「入侵紅火蟻」所築的特殊隆起蟻丘（或稱蟻塚）。最好的方法就是發現紅火蟻或是蟻丘時，儘速離開並通知相關單位處理，在學校發現時，請儘速通知總務處或訓導處處理。



紅火蟻叮咬後如何處理？

Dealing the wound cause by RIFA

一、 遭紅火蟻叮咬的基本症狀

入侵紅火蟻攻擊人類時，係由工蟻以大顎緊咬著皮膚，且利用其螫針連續針刺 7 至 8 次，毒囊中大量的毒液注入皮膚，而立即引發劇烈的灼熱感，此種灼熱與癢的感覺將持續 1 小時以上，4 小時後被螫處形成白色膿泡，大部分的人 10 天左右便可復原，但通常會留下一些疤痕。若膿泡破掉，則常常容易引起細菌的二次性感染；一些體質敏感的人，遭入侵紅火蟻的叮咬後，可能產生過敏性的休克反應，嚴重者甚至死亡。

二、 叮咬後基本處理步驟

1. 先將被叮咬的部位予以冰敷處理，並以肥皂與清水清洗被叮咬的患部。
2. 一般可以使用含類固醇的外敷藥膏或是口服抗組織胺藥劑來緩解搔癢與腫脹的症狀，但必須于醫生診斷指示下使用上述藥劑。
3. 被叮咬後應儘量避免傷口的二次性感染，並且避免將膿泡弄破。
4. 若是患有過敏病史或叮咬後有較劇烈的反應，如全身性搔癢、蕁麻疹、臉部燥紅腫脹、呼吸困難、胸痛、心跳加快等症狀或其他特殊生理反應時，必須盡速至醫療院所就醫。
(以上資料由衛生署提供)



學校預防措施

Keeping away from RIFA

1. 本校每週請總務處派人清查校園各處是否有紅火蟻入侵，如有發現，立即隔離該區域並標示警告標語，並請相關單位協助清除紅火蟻工作。
2. 印發宣導單給各班學生，並請老師協助宣導防治方法。
3. 如在校外有發現紅火蟻蟻巢時，請立即撥打 0800095590 免付費通報電話或撥打 119 請消防隊派人處理。